

آهنگ تغییر


با مفهوم سرعت متوسط در فیزیک آشنا شده‌اید. اگر اتومبیلی در امتداد خط راست مسافت $28\text{ کیلومتر} = 28^\circ$ در 4 ساعت طی کند سرعت متوسط آن در این زمان $= 7^\circ$ کیلومتر بر ساعت است. با این حال ممکن است اتومبیل در لحظات مختلف سرعت سرعت های متفاوتی داشته باشد. همچنین مطابق آنچه که در درس فیزیک آموخته‌اید، سرعت متوسط روی یک بازه زمانی خیلی کوچک، به سرعت لحظه‌ای تزدیک است. اگر نمودار مکان–زمان در مورد حرکت اتومبیل را داشته باشیم، سرعت متوسط اتومبیل بین هر دو لحظه دلخواه، برابر شیب خطی است که نمودار مکان–زمان را در آن دو لحظه قطع می‌کند.

همچنین در درس فیزیک سرعت لحظه‌ای در هر لحظه دلخواه t ، برابر شیب خط مماس بر نمودار در آن لحظه تعریف شد. با آنچه که در درس‌های گذشته ملاحظه کردید، می‌توان گفت که سرعت در لحظه t همان مقدار مشتق تابع (مکان–زمان) در لحظه t است. مفهوم مشتق را در بسیاری از پدیده‌های دیگر نیز می‌توان مشاهده کرد. ابتدا در مورد سرعت متوسط و سرعت لحظه‌ای به ذکر مثالی خواهیم پرداخت.



مثال : خودرویی در امتداد خط راست طبق معادله $d(t) = -5t^3 + 20t$ حرکت می‌کند، که در آن $t \leq 5$ بحسب ثانیه است. با در نظر گرفتن نمودار مکان – زمان (شکل) :

(الف) سرعت متوسط خودرو را در بازه‌های زمانی $[1, 2]$ ، $[1, 5]$ و $[1, 4]$ به دست آورید.



ب) اگر به همین ترتیب بازه‌های کوچک‌تری مانند $[1, 1/3]$ و $[1, 2/3]$ و ... اختیار کنیم، سرعت متوسط در این بازه‌ها به چه عددی نزدیک می‌شود؟

پ) سرعت لحظه‌ای را با استفاده از مشتق تابع d در $t=1$ به دست آورید.

ت) سرعت لحظه‌ای در $t=2$ و $t=3$ چقدر است؟

حل :

(الف)

$$\text{سرعت متوسط در بازه زمانی } [1, 2] = \frac{d(2) - d(1)}{2 - 1} = \frac{20 - 15}{1} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{سرعت متوسط در بازه زمانی } [1, 1/5] = \frac{d(1/5) - d(1)}{1/5 - 1} = \frac{18/75 - 15}{0/5} = \frac{3/75}{0/5} = 7/5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\text{سرعت متوسط در بازه زمانی } [1, 1/4] = \frac{d(1/4) - d(1)}{1/4 - 1} = \frac{18/2 - 15}{0/4} = \frac{3/2}{0/4} = 1.5 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

ب) اگر به همین ترتیب بازه‌های زمانی کوچک‌تری اختیار کنیم، سرعت متوسط به سرعت لحظه‌ای در $t=1$ نزدیک می‌شود.

$$(پ) d'(1) = 10^\circ, \text{ پس } d'(t) = -10t + 20^\circ$$

$$(ت) d'(2) = 0^\circ, \quad d'(3) = -10^\circ$$

سرعت در لحظه $t=2$ ، صفر است و مماس بر منحنی در این نقطه موازی محور x هاست و خودرو ساکن است. مقدار سرعت در لحظه‌های $t=3$ برابر است و علامت منفی در مورد $(3', d)$ نشان می‌دهد که جهت حرکت در $t=3$ برخلاف جهت حرکت در $t=1$ است.

به جز مفهوم سرعت، در مطالعه پدیده‌های زیاد دیگری که در قالب یک تابع نمایش داده می‌شوند با موضوع نسبت تغییرات متغیر وابسته به تغییرات متغیر مستقل موافق می‌شویم. نسبت تغییرات دما به تغییرات زمان و همچنین نسبت تغییرات جمعیت نسبت به زمان نمونه‌های دیگری از اینگونه تغییرات هستند.

به طور کلی آهنگ متوسط تغییر یک تابع را در بازه‌ای مانند $[a, a+h]$ به شکل زیر تعریف می‌کنیم :

$$\text{آهنگ متوسط تغییر تابع } f \text{ در بازه } [a, a+h] = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$


همچنین آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع f را به صورت زیر تعریف می‌کنیم :

$$x=a \text{ آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع } f \text{ در نقطه } = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

آهنگ متوسط تغییر با شب خط قاطع و آهنگ لحظه‌ای تغییر با مقدار مشتق و شب خط مماس در آن نقطه برابرند.

کار در کلاس

- ۱ نمودار زیر موقعیت یک ذره را در لحظه t نمایش می‌دهد. مقادیر زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید :
(محاسبه عددی لازم نیست).




- A سرعت متوسط بین $t=1$ و $t=3$
- B سرعت متوسط بین $t=5$ و $t=6$
- C سرعت لحظه‌ای در $t=1$
- D سرعت لحظه‌ای در $t=3$
- E سرعت لحظه‌ای در $t=5$
- F سرعت لحظه‌ای در $t=6$

کاربردهایی دیگر از آهنگ متوسط تغییر و آهنگ لحظه‌ای تغییر

آهنگ رشد: نابع $f(x) = \sqrt{7x} + 5^\circ$ قدر متوسط کودکان را بر حسب سانتی‌متر ناحدود 6° ماهگی نشان می‌دهد، که در آن x مدت زمان پس از تولد (بر حسب ماه) است. به طور مثال $f(25) = 85$ آهنگ متوسط رشد در بازه زمانی $[6^\circ, 25^\circ]$ چنین است:

$$\frac{f(6^\circ) - f(0)}{6^\circ - 0} = \frac{\sqrt{7 \cdot 6} + 5^\circ - 5^\circ}{6^\circ} \approx 0.9^\circ/\text{ماه}$$

يعني در طی ۵ سال، رشد متوسط قد حدود 9° سانتی‌متر در هر ماه است.



کار در کلاس

الف) آهنگ متوسط رشد در بازه زمانی $[0^\circ, 25^\circ]$ چقدر است؟


ب) آهنگ لحظه‌ای تغییر قد کودک را در ۲۵ ماهگی و ۴۹ ماهگی، با هم مقایسه کنید. کدام یک بیشتر است؟

پ) اگر قد علی در ۱۶ ماهگی، 80° سانتی‌متر و در ۳۶ ماهگی، 95° سانتی‌متر باشد، آهنگ متوسط تغییر رشد او را در این فاصله حساب کنید و با نمودار بالا مقایسه کنید.

نرخ باروری: نمودار زیر روند رو به کاهش نرخ باروری در کشورمان را در طی نیم قرن نمایش می‌دهد. آهنگ متوسط تغییر باروری در بازه زمانی [۱۳۳۹، ۱۳۸۹] در مدت ۵۰ سال برابر است با:

$$\frac{1/6 - 7}{1389 - 1339} = \frac{-5/4}{50} = -0.108$$

آهنگ متوسط تغییر باروری در بازه زمانی [۱۳۷۹، ۱۳۶۴] را بدست آوردید. (با استفاده از مقادیر تقریبی روی نمودار) بازه زمانی را مشخص کنید که در آن آهنگ متوسط تغییر باروری مثبت باشد.




خواندنی

نرخ باروری در ایران در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به حدود ۶/۵ فرزند رسید. با توجه به اینکه کشورمان امکانات لازم برای چنین رشد جمعیت بالایی را دارا نبود، سیاست‌های کاهش جمعیت و عوامل دیگر باعث شد که نرخ باروری تا سال ۱۳۸۵ به ۱/۹ کاهش یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که کاهش باروری در ایران بزرگ‌ترین و سریع‌ترین کاهش باروری ثبت شده بود. کارشناسان معتقدند که باید سیاست‌های کاهش رشد جمعیت پس از کاهش نرخ باروری به حدود ۲/۵ فرزند متوقف می‌شد. کاهش رشد جمعیت مشکلات فراوانی نظیر کاهش نیروی کار و بحران سالماندی را دری چو اهد داشت. با ابلاغ سیاست‌های کلی «جمعیت» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۳، و تغییر برنامه‌های وزارت بهداشت، براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، نرخ باروری به حدود ۲/۰ افزایش یافته است. با این حال نگرانی‌های مربوط به احتمال کاهش بیش از حد رشد جمعیت در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۲۵ تأکید می‌کند که این سیاست‌ها تا دست‌یابی کامل به اهداف تعیین شده باید دنبال شود.

سريعت متوسط و سريعت لحظه‌اي

مثال: جسمی را از سطح زمين به طور عمودی پرتاب می‌کيم. جهت حرکت به طرف بالا را مثبت در نظر می‌گيريم. فرض کنيم ارتفاع اين جسم از سطح زمين در هر لحظه از معادله $h(t) = -5t^2 + 40$ بدست می‌آيد. به طور مثال ۲ ثانие پس از پرتاب اين جسم در ارتفاع ۶۰ متری از سطح زمين است.

به هر حال جسم پس از مدتی به زمين بر می‌گردد. نمودار مكان-زمان حرکت اين جسم در شكل نشان داده شده است.



اگر سريعت متوسط اين جسم در بازه‌های زمانی $[1, 2]$, $[2, 3]$, $[3, 4]$ و $[0, 1]$ را به ترتیب با v_1 , v_2 , v_3 و v_4 نمایش دهیم، داریم:

$$v_1 = \frac{h(2) - h(1)}{2 - 1} = \frac{60 - 40}{2 - 1} = 20 \text{ m/s}$$

$$v_2 = \frac{h(3) - h(2)}{3 - 2} = \frac{70 - 60}{3 - 2} = 10 \text{ m/s}$$

$$v_3 = \frac{h(4) - h(3)}{4 - 3} = \frac{80 - 70}{4 - 3} = 10 \text{ m/s}$$

$$v_4 = \frac{h(1) - h(0)}{1 - 0} = \frac{40 - 0}{1 - 0} = 40 \text{ m/s}$$

سرععت لحظه‌اي در زمان‌های $t=1$, $t=2$, $t=3$ و $t=4$ با استفاده از مشتق تابع h چنین بدست می‌آيد:

$$h(t) = -5t^2 + 40 \Rightarrow h'(t) = -10t + 40$$

$$h'(1) = 30 \text{ m/s}, \quad h'(2) = 20 \text{ m/s}, \quad h'(3) = 10 \text{ m/s}, \quad h'(4) = 0 \text{ m/s}$$

در $t=4$ جسم به بالاترین ارتفاع خود از سطح زمين (۸۰ متر) می‌رسد و در اين لحظه سرععت آن برابر صفر (متر بر ثانيه) می‌شود. سپس جسم شروع به حرکت به طرف زمين می‌کند. سرععت متوسط در بازه $[4, 5]$ برابر $\frac{h(5) - h(4)}{5 - 4} = \frac{70 - 60}{1} = -10 \text{ m/s}$ و سرععت لحظه‌اي در $t=5$ برابر -10 m/s است. علامت منفی نشان می‌دهد که حرکت جسم رو به پائين است.

با توجه به مثال قبل :

الف) سرعت جسم هنگام پرتاب و هنگام برخورد به زمین را به دست آورید.

ب) سرعت متوسط جسم را در بازه زمانی [٨, ٥] به دست آورید.

پ) لحظاتی را معلوم کنید که سرعت جسم 35 m/s و -35 m/s است.

تمرین

۱ جدول زیر درجه حرارت T (سانتی‌گراد) را در شهری از ساعت ٨ تا ١٨ در یک روز نشان می‌دهد.

ساعت t	٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧	١٨
درجه حرارت T	١١	١٣	١٤	١٧	١٩	١٨	١٧	١٥	١٣	١٠	٩

آهنگ تغییر متوسط درجه حرارت نسبت به زمان را :

الف) از ساعت ٨ تا ساعت ١٢ به دست آورید.

ب) از ساعت ١٢ تا ساعت ١٨ به دست آورید.


پ) پاسخ‌ها را تفسیر کنید.


۲ کسری از جمعیت یک شهر که به وسیله یک ویروس آلوده شده‌اند بر حسب زمان (هفته) در نمودار زیر نشان داده شده است.

الف) شب‌های خطوط l و d چه چیزهایی را نشان می‌دهند.

ب) گسترش آلودگی در کدامیک از زمان‌های $t=1$ ، $t=2$ ، $t=3$ یا $t=4$ بیشتر است؟

پ) قسمت ب را برای $t=4$ ، $t=5$ و $t=6$ بررسی کنید.





- ۳ نمودار روبه رو نمایش میزان فروش تعداد نوعی کالا (N) پس از صرف t میلیون تومان هزینه برای تبلیغ است.
- الف) آهنگ تغییر N بحسب t را وقتی t از $0, 1, 2, 3$ و 4 تا $1, 2, 3$ و 4 تغییر می کند به دست آورید.

ب) به نظر شما چرا آهنگ تغییرات، وقتی که مقادیر t افزایش می یابند، در حال کاهش است؟

- ۴ معادله حرکت متحرکی به صورت $f(t) = t^3 - t + 1$ (بر حسب ثانیه) در کدام لحظه سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه زمانی $[5, 0]$ با هم برابرند؟

t	ثانیه	۰	$\frac{۱}{۱}$	$\frac{۲}{۲}$	$\frac{۳}{۳}$	$\frac{۴}{۴}$	$\frac{۵}{۵}$	$\frac{۶}{۶}$
$f(t)$	متر	۱۱	$12\frac{۱}{۴}$	$13\frac{۷}{۸}$	$15\frac{۱}{۱}$	$16\frac{۳}{۴}$	$17\frac{۴}{۴}$	$18\frac{۱}{۴}$

بر اساس جدول کدامیک از مقادیر زیر می تواند سرعت توب را هنگامی که در ارتفاع نظیر زمان $4/0$ ثانیه، است نشان دهد؟

- الف) $1/22m/s$ ب) $14/91m/s$ ت) $16/03m/s$ پ) $11/5m/s$

x	۰	۵	۱۰	۱۵	۲۰
$f(x)$	۱۰۰	۷۰	۵۵	۴۶	۴۰
مقدار تقریبی $f'(x)$	-۶				

- ۵ تویی از یک پل به ارتفاع ۱۱ متر به هوا پرتاب می شود. $f(t)$ نشان دهنده فاصله توب از سطح زمین در زمان t است. برخی از مقادیر $f(t)$ در جدول روبه رو نمایش داده شده است.

بر اساس جدول کدامیک از مقادیر زیر می تواند سرعت توب را هنگامی که در ارتفاع نظیر زمان $4/0$ ثانیه، است نشان دهد؟

- الف) $1/22m/s$ ب) $14/91m/s$ ت) $16/03m/s$ پ) $11/5m/s$

- ۶ با توجه به مقادیر تابع f در جدول روبه رو، f' را برای نقاط داده شده تخمین بزنید. به طور مثال $f'(0) \approx -6$. بقیه جدول را کامل کنید.

۷ کدامیک از عبارات زیر درست و کدامیک نادرست است :

- الف) آهنگ تغییر متوسط تابعی مانند f در بازه $[1, 0]$ همیشه کمتر از شیب آن منحنی در نقطه است.
- ب) اگر تابعی صعودی باشد، آهنگ تغییر متوسط آن، همواره صعودی است.
- پ) تابعی وجود ندارد که برای آن هم $f'(a) = 0$ و هم $f(a) = 0$ باشد.

۸ یک توده باکتری پس از t ساعت دارای جرم $m(t) = \sqrt{t} + 2t^3$ گرم است.

الف) جرم این توده باکتری در بازه زمانی $4 \leq t \leq 3$ چند گرم افزایش می یابد؟

ب) آهنگ رشد جرم توده باکتری در لحظه $t=3$ چقدر است؟

- ۹ گنجایش ظرفی 40 لیتر مایع است. در لحظه $t=0$ سوراخی در ظرف ایجاد می شود. اگر حجم مایع باقی مانده در ظرف پس از t ثانیه از رابطه $\frac{t}{100} - 40 = V$ به دست آید:

الف) آهنگ تغییر متوسط حجم مایع در بازه زمانی $[1, 0]$ چقدر است؟

ب) در چه زمانی، آهنگ تغییر لحظه‌ای حجم برابر آهنگ تغییر متوسط آن در بازه $[10, 0]$ می شود؟